

GREATER BOSTON GASTROENTEROLOGY

George Dickstein, MD

Steven N. Fine, MD

Mark A. Painter, MD

Jaime A. Oviedo, MD FACG

Greta Taitelbaum, MD CM FRCP(C) FACG

475 Franklin Street, Suite 110 Framingham, MA 01702 508-620-9200

**PREPARAÇÃO PARA ERCP - (E)ndoscopic (R)etrograde (C)holangi(P)ancreatography)**

Você tem um apontamento para fazer um ERCP no dia de \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_

Por favor chegar a regisração de pacientes as \_\_\_\_\_

**MetroWest Medical Center**

67 Union Street  
3rd floor / Outpt Reg  
Natick, MA 01760

**MetroWest Medical Center**

115 Lincoln Street  
1st floor / Outpt Reg  
Framingham, MA 01702

**Boston Endoscopy Center**

175 Worcester Street  
Wellesley Hills, MA 02481

- 1 **Você tem de ter uma pessoa da sua familia com você para vos conduzir até a sua casa e depois da examinação por causa dos medicamentos que são dados durante o exame.**
- 2 **Você tem de ter o dia fora, não pode trabalhar, conduzir, ou fazer qualquer coisa na noite. De manhã você vai ter de limpar os seus intestinos para o exame e na tarde vai estar a descansar por causa dos medicamentos que voce vai receber durante o exame**
- 3 **Por favor trazer com você no dia do exame uma lista de todos os medicamentos que você toma normalmente**
- 4 **Quando o vosso apontamento foi feito, a segurança que nos temos e a seguinte:**

\_\_\_\_\_

**Se a vossa segurança mudou, por favor chamar o escritório o numero 508-620-9200 ao menos 14 dias antes do seu exame. Você vai ter de pagar o exame se não temos a informação correta da sua segurança.**

Por favor seguir todas as instruções completamente. Se você tem qualquer pergunta sobre esta preparação, por favor chame-nos.

1. Se você sabe que tem um problema de coração ou uma valve artificial para o coração, por favor diga-nos porque os antibioticos são necessarios para não ter nenhuma infecção.
2. Por favor, diga-nos se você toma Coumadin ou Warfarin, você deve de parar de tomar esses comprimidos 5 dias antes do exame
3. Por favor, diga-nos se você toma insulín. Vai ter de mudar isso para a preparação e o exame. Se você toma comprimidos para os diabetes, toma a meia dose do que toma normalmente no dia do exame.
4. Este exame muitas vezes é feito com ray-x. Se você sabe que esta de bebé ou você pensa que pode estar pregrna, por favor diga-nos antes do exame.
5. Não tomar aspirina, comprimidos com aspirina, Ecotrin, Bufferin, Anacin, Advil, Aleve, Nuprin, Motrin, Ibuprofen, ou outros comprimidos contra a inflamação ou Plavic por 7 dias antes do exame. Se tem algum problema com isto, por favor falar disso com o seu doutor. Pode tomar Tylenol ou acetaminophen quando queira antes e depois do exame. Não tomar suplementes de iron por 7 dias antes do exame.
6. Você tem de ter uma pessoa da sua familia ou um amigo com você para vos conduzir até a sua casa e depois do exame por cousa dos medicamentos que são dados durante o exame. O ERCP sô pode ser feito se você tem uma pessoa com você para vos acompanhar quando você sai do hospital.
7. Se o seu exame e **antes do meio dia**, nao deve tomar nada por a boca e depois de meia noite menos os seus medicamentos normais com um bocado de agua. Se o seu apontamento é **depois do meio dia**, pode tomar liquidos claros ate quatro horas antes o seu exame.

O seguinte e uma lista de liquidos considerados claros: **canja de galinha, gingerale, sprite, 7-up, sumo de maçã, sumo de uva branca, agua, gelados, jello (nenhum de cor vermelho ao cor de vinho, não pode tomar com fruta ou creme) café ou chá (pode tomar com açúcar mas nenhum leite ou creme)**